



LABORATORIO DE ANÁLISIS DA VINCI
Sede central Via Isella n. 89 27025 Gambolò (PV)
TEL 0381-930898

Método de recogida de la muestra FECI para la búsqueda de PARÁSITOS INTESTINALES

El examen parasitológico de las heces permite detectar huevos y parásitos en las heces; la prueba se realiza en caso de diarrea prolongada o de presencia de sangre o mucosidad en las heces.

- Utilizar el envase estéril proporcionado por el laboratorio o disponible en farmacias.
- Defeca sobre una hoja de papel higiénico o toallas de papel o en un recipiente de plástico limpio, pero no en el retrete.
- Abrir el recipiente y recoger con la espátula una cantidad de heces del tamaño de una nuez (o su equivalente si las heces son politácticas o líquidas).
- Cierre el envase y lávese bien las manos.
- Devuelva el recipiente al laboratorio en las dos o tres horas siguientes a la recogida. Como alternativa, guárdelo en un frigorífico (a $+2\div 8$ °C): de este modo, el material puede conservarse hasta 24 horas.

TENGA EN CUENTA:

- La toma de determinados medicamentos puede influir en los resultados del análisis de heces. Por este motivo, es conveniente informar al médico de cualquier medicación actual para considerar la posibilidad de suspenderla en las semanas previas a la recogida de muestras.
- No es necesario seguir ninguna dieta especial en los días previos a la recogida de heces.